



## COMPOSICIÓN

NUTRIENTES	% (P/V)	CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	36	Densidad mínima	1390 g/L
Potasio (K <sub>2</sub> O)	33	pH	6,5 - 7,0
Bases orgánicas	0,1	Color	Incolora
		Solubilidad	100%

## INFORMACIÓN GENERAL

**POLIFAITH® 36-33 SL**, es un fertilizante con alto contenido de fósforo y potasio en la forma de fosfito potásico.

**POLIFAITH® 36-33 SL**, estimula el sistema hormonal, promoviendo mecanismos defensivos naturales. Por su movilidad acropétalo y basipétalo, el fosfito se diferencia de los fungicidas sistémicos ya que en la mayoría de los casos son solamente ascendentes. Los fosfitos no actúan como inhibidores o destructores del patógeno, sino como un estimulante en la producción de defensas naturales contra el ataque.

**POLIFAITH® 36-33 SL**, es un eficiente desobturador vascular, suministra potasio a la planta y es un activador metabólico en estados post estrés.

En tratamientos de huertos o cultivos enfermos o de alto riesgo, mezclar 100 cc de Cito-Cur® SL, por 100 lt de agua, más 210 a 270 cc de **POLIFAITH® 36-33 SL**, por 100 lt de agua.

**POLIFAITH® 36-33 SL**, ha sido diseñado especialmente para uso foliar (pH neutro).

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	LT/HA	N° APLIC.	OBSERVACIONES
Vides	4 a 5	2 - 5	• A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
Pomáceas	4 a 5	2 - 5	• Desde caída de pétalos y cada 15 días. Post cosecha temprana.
Carozos	4 a 5	2 - 5	• Desde fruto cuajado. Repetir a los 15 días. Post cosecha temprana.
Cítricos y Paltos	4 a 5	2 - 5	• Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 15 - 30 días.
Berries	4 a 5	2 - 5	• Después de la floración, repetir cada 15 días. Post cosecha temprana.
Kiwi	4 a 5	2 - 5	• A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
Avellano Europeo	4 a 5	2 - 5	• A partir de brotación, intervalos de 15 días.
CULTIVOS	LT/HA	N° APLIC.	OBSERVACIONES
Hortalizas: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, colífor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.	250 a 400	2 - 5	• 15 días después del trasplante, repetir cada 15 días. • Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días.



## COMPATIBILIDAD

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad. No mezclar con agroquímicos de contacto.

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono - Fax: (56-2) 2738 95 13 • 2738 94 05

[nva@nva.cl](mailto:nva@nva.cl) • [www.nva.cl](http://www.nva.cl)