

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO SOLUBLE A BASE DE BORO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

BASES ORGÁNICAS	12,00
BORO (B)	9,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1210 g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	8
COLOR	ÁMBAR
SOLUBILIDAD	100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

FOLIAFEED B® SL, es un fertilizante líquido a base de boro y etanolamina. Por su alta pureza y solubilidad es utilizado vía foliar, permitiendo su segura aplicación en cualquier estado fenológico de la planta.

FOLIAFEED B® SL, debe ser aportado en la etapa de pre floración, inicio de maduración y post cosecha

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	200 - 300	3 - 4	Prefloración para favorecer polinización y cuaja. Pinta. Post cosecha temprana con hojas activas.
POMÁCEAS	200 - 300	3 - 4	Desde botón floral hasta inicio de floración. Quiebre de color. En post-cosecha temprana, con hojas activas.
CAROZOS	200 - 300	3 - 4	Desde botón floral hasta inicio de floración. Quiebre de color. En post-cosecha temprana, con hojas activas.
CÍTRICOS Y PALTOS	200 - 300	3 - 4	Desde 20 días antes de floración hasta inicio de floración. Quiebre de color.
BERRIES	200 - 300	3 - 4	Desde botón floral hasta inicio de floración. Pinta. En post cosecha temprana con hojas activas.
KIWIS	200 - 300	3 - 4	Prefloración para favorecer polinización y cuaja. Inicio maduración. Post cosecha temprana con hojas activas.
NOGAL	200 - 300	3 - 4	Inicio de Floración. Inicio del proceso de llenado y poscosecha.
AVELLANO EUROPEO	200 - 300	3 - 4	Inicio de Brotación. Inicio del proceso de llenado y poscosecha
CULTIVOS	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	200	1 - 3	Desde 15 días post emergencia, repetir cada 7 días.
CEREALES	200	1 - 2	
LEGUMINOSAS	200	1 - 2	

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.