

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO SOLUBLE A BASE DE POTASIO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| BASES ORGÁNICAS            | 30,00 |
| POTASIO (K <sub>2</sub> O) | 25,00 |

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| DENSIDAD A 20° C            | 1220 g/L      |
| PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10% | 7             |
| COLOR                       | MARRÓN OSCURO |
| SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C  | 100%          |

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

**FOLIAFEED K®SL**, es una formulación líquida so- bre a base de humatos de potasio. **FOLIAFEED K®SL**, corrige deficiencia de potasio y es capaz de aumentar los solutos intracelulares, modificando el umbral de congelamiento. Puede ser usado como preven- ción de heladas. Dosis de 400cc/100 litros de agua ayudarán en la protección del cultivo por 8-10 días.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

| FRUTALES          | cc / 100lt | Nº DE TRATAMIENTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIDES             | 300 - 400  | 2 - 3              | Desde 30 días antes de pinta, repetir a los 15 días. Realizar una tercera aplicación en fruta de color a inicio de pinta                                                                                                                                                                                                 |
| POMÁCEAS          | 300 - 400  | 3 - 4              | Desde fruto 2,5 cm. hasta 20 días antes de la cosecha.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAROSOS           | 300 - 400  | 3                  | Desde endurecimiento del carozo a quiebre de color.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CÍTRICOS Y PALTOS | 300 - 400  | 3                  | Con brotes en activo crecimiento de primavera. Repetir cada 7 días.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BERRIES           | 300 - 400  | 3 - 4              | Desde floración, repetir cada 7 días                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KIWIS             | 300 - 400  | 3                  | 60 - 45 y 30 días antes de cosecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOGAL             | 300 - 400  | 3                  | Desde inicio del proceso de llenado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AVELLANO EUROPEO  | 300 - 400  | 3                  | Desde inicio del proceso de llenado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OLIVO             | 300        | 3                  | Apartir de fruto cuajado, cada 7 - 10 días.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CULTIVOS          | cc / 100lt | Nº DE TRATAMIENTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HORTALIZAS*       | 300 - 400  | 3 - 6              | Hortalizas de hoja o tallo, desde 20 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días.<br>Hortalizas de fruto, a partir de la cuaja de los primeros frutos. Repetir cada 7-10 días.<br>Tubérculos y raíces, a partir de 40 días previos a la cosecha, repetir a los 10 y 20 días |

Hortalizas\*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.