

FertiStress®

UVA DE MESA

Fisiología activa para sostener el valor del racimo.



El estrés también se expresa en el racimo

En uva de mesa, el calor, la alta radiación y el déficit hídrico pueden comprometer el crecimiento y la maduración de las bayas, así como la condición del raquis. Mantener la actividad fisiológica de la parra es clave en estas etapas.

FertiStress® es un bioestimulante foliar que mejora la tolerancia y recuperación frente al estrés abiótico. Se integra al manejo del parronal para sostener su funcionamiento en períodos de alta exigencia ambiental.

TOLERANCIA**ACTIVIDAD FISIOLÓGICA****RECUPERACIÓN**

Aplicar en el momento correcto

Dos momentos fenológicos y una estrategia frente al estrés, ajustados a la condición de cada parronal.

01 / DESARROLLO DEL RACIMO



Término de caída natural de granos

Aplicar una vez finalizada la caída natural de granos. En esta fase de desarrollo del racimo, sostener la actividad metabólica de la parra ayuda a enfrentar las exigencias ambientales durante el crecimiento de las bayas.

02 / INICIO DE MADURACIÓN



Ablandamiento de granos

Aplicar al comenzar el ablandamiento de las bayas. La maduración implica cambios en textura y acumulación de azúcares; en variedades coloreadas, también comienza la expresión del color. Es una etapa sensible para la condición de la fruta y del raquis.



03 / RESPUESTA AL AMBIENTE

Antes o después del estrés

Alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico. Anticipar la aplicación cuando se prevén estas condiciones o utilizarla después del evento para favorecer la recuperación fisiológica.

Beneficios para la uva de mesa



Mayor tolerancia al estrés

Mejora la respuesta de la parra frente al estrés térmico e hídrico.



Actividad fisiológica sostenida

Ayuda a mantener el metabolismo en etapas exigentes de desarrollo y maduración del racimo.



Recuperación y estabilidad

Favorece la recuperación fisiológica y contribuye a la estabilidad del cultivo bajo condiciones adversas.

Dosis y aplicación foliar

1,2 L/ha

POR APLICACIÓN

1 a 3

APLICACIONES



Preparación. Agitar bien el envase antes de usar.



Cobertura. Ajustar el volumen de agua al equipo y a la arquitectura del parronal para lograr una cobertura foliar adecuada y homogénea.



Momento del día. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, con viento en calma y temperaturas moderadas.

Definir el programa según variedad, zona, condición de la parra y situación de estrés, integrado al manejo hídrico y nutricional.

Asesoría técnica NVA

+56 9 9560 3355

+56 2 2738 9405