

BIOESTIMULANTE FOLIAR PARA CONDICIONES DE ESTRÉS ABIÓTICO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO

COMPOSICIÓN	% P/V
EXTRACTO DE ALGA <i>Durvillaea antarctica</i>	10,00
EXTRACTO VEGETAL DE CACTUS	10,00
AMINOÁCIDOS DE ORIGEN VEGETAL	5,50
GLICINA BETAÍNA	4,00
ANTIOXIDANTES	2,00

CONTAMINANTES (ppm): Cd 1,5 ; Cr VI 2 ; Hg 1 ; Ni 50 ; Pb 120 ; As 40 ; Cu 600 ; Zn 1500
Escherichia coli: Ausente Salmonella spp.: Ausente

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1035g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	5
COLOR	ÁMBAR OLIVÁCEO
SOLUBILIDAD A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.
Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile
Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

FERTISTRESS® mejora la tolerancia y capacidad de recuperación de los cultivos frente a condiciones de estrés fisiológico en etapas críticas del desarrollo, tales como déficit hídrico, estrés térmico y otros. Su formulación combina extractos vegetales bioactivos, osmoprotectores, aminoácidos, antioxidantes y vitaminas, contribuyendo al equilibrio fisiológico y a la estabilidad productiva del cultivo bajo condiciones adversas.

FRUTALES	DOSIS	N° DE TRATAMIENTOS	MOMENTOS RECOMENDADOS DE APLICACIÓN
PALTO	1 - 1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Inicio de floración, llenado y maduración de frutos, antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.
CEREZO	0,8 - 1 L/ ha por aplicación	1 - 3	Inicio de floración, fruto pajizo, post cosecha, antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.
UVA DE MESA	1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Término de caída natural de granos, ablandamiento de granos, antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.
ARÁNDANO	1 - 1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	20% floración, inicio de pinta e inicio tercera vuelta de cosecha, antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.
NOGAL	1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Flor no receptiva, inicio proceso de llenado de frutos, antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.
AVELLANO EUROPEO	1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Prefecundación, inicio proceso de llenado de frutos, antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.
KIWI	0,8 L/ ha por aplicación	1 - 3	Post cuaja, inicio llenado y maduración de frutos, antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.
FRAMBUESA	0,8 L/ ha por aplicación	1 - 3	20% floración, inicio de pinta e inicio tercera vuelta de cosecha, antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.
HORTALIZAS	0,8 - 1 L/ ha por aplicación	1 - 3 por ciclo	Post emergencia o post trasplante, antes o después de condiciones de estrés térmico, hídrico o salino.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos

INSTRUCCIONES DE USO: Agitar bien el envase antes de usar. Asperjar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando viento y temperaturas extremas. Aplicar en un volumen de agua que permita una cobertura adecuada y homogénea del follaje.

COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.