

Recomendaciones por cultivo

Dosis y momentos de aplicación foliar

Cerezo

0,8 - 1 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- Inicio de floración.
- Fruto pajizo.
- Postcosecha.
- Antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.

Nogal

1,2 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- Flor no receptiva.
- Inicio del proceso de llenado de frutos.
- Antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.

Avellano europeo

1,2 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- Prefecundación.
- Inicio del proceso de llenado de frutos.
- Antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.

Aplicar en un volumen de agua que permita una cobertura adecuada y homogénea del follaje.

Agitar antes de usar. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando viento y temperaturas extremas.

Recomendaciones por cultivo

Dosis y momentos de aplicación foliar

Arándano

1 - 1,2 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- 20% de floración.
- Inicio de pinta.
- Inicio de la tercera vuelta de cosecha.
- Antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.

Palto

1 - 1,2 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- Inicio de floración.
- Llenado y maduración de frutos.
- Antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.

Uva de mesa

1,2 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- Término de caída natural de granos.
- Ablandamiento de granos.
- Antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.

Aplicar en un volumen de agua que permita una cobertura adecuada y homogénea del follaje.

Agitar antes de usar. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando viento y temperaturas extremas.

Recomendaciones por cultivo

Dosis y momentos de aplicación foliar

Frambuesa

0,8 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- 20% de floración.
- Inicio de pinta.
- Inicio de la tercera vuelta de cosecha.
- Antes o después de altas temperaturas, radiación y/o déficit hídrico.

Kiwi

0,8 L/ha

por aplicación

1 - 3 tratamientos

- Postcuaaja.
- Inicio de llenado y maduración de frutos.
- Antes o después de períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico.

Hortalizas

0,8 - 1 L/ha

por aplicación

1 - 3 por ciclo tratamientos

- Postemergencia o postrasplante.
- Antes o después de condiciones de estrés térmico, hídrico o salino.

Aplicar en un volumen de agua que permita una cobertura adecuada y homogénea del follaje.

Agitar antes de usar. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando viento y temperaturas extremas.